

Prevención de infecciones intrahospitalarias

Fecha desde: 15/6/2020 Hasta: 26/6/2020

AE 1. BRINDA CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESPETANDO LAS NORMAS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE PACIENTES.

OBJETIVO: CONOCER PRINCIPALES PATOLOGÍAS IAAS, SIGNOS Y SÍNTOMAS. CONOCER PROTOCOLOS DE MANEJO IAAS MINSAL.

PATRICIA PACHECO CRUZ

DOCENTE ENFERMERÍA EMTF

PREVENCIÓN DE ENDOMETRITIS POST PARTO





Introducción

* Endometritis puerperal

Definición:

Es la infección del endometrio se produce por gérmenes que tienen, como puerta de entrada la herida que queda en la zona del endometrio donde estuvo insertada la placenta, y desde ahí la infección se propaga a toda la mucosa endometrial.



Infección del Endometrio posterior a parto vaginal o cesárea

- ▶ Caracterizada por:
- ▶ Fiebre en las primeras horas
- ▶ Dolor abdominal bajo
- ▶ Inflamación
- ▶ Sub involución uterina (condición médica en la que tras el parto , el útero no vuelve a su tamaño normal)
- ▶ Loquios de mal olor
- ▶ Sobre el 84% presenta un inicio precoz, antes del 7 día post parto

Antecedentes

- ▶ Pueden provocar *bacteremias en un 5% y abscesos pelvianos en un 1,9 %
- ▶ Diagnóstico principalmente clínico
- ▶ Por lo general polimicrobianas.
- ▶ identificación de microorganismos en menos de un 30%.

* Bacteriemia es la presencia de bacterias en la sangre. La sangre es normalmente un medio estéril, por lo tanto la detección de bacterias es indicativa de infección. La definición de bacteriemia no requiere un cuadro clínico manifiesto.

Factores de riesgo intrínsecos

- ▶ Bajo nivel socio económico
- ▶ Anemia
- ▶ Rotura prolongada de membranas antes del parto
- ▶ Vaginosis bacteriana
- ▶ Corioamnionitis (Infección del líquido amniótico)
- ▶ Menor edad materna

Factores asociados a la atención de salud

- ▶ Trabajo de parto prolongado (mayor a 12 horas)
- ▶ Número de tactos vaginales (mayor a 4)
- ▶ Extracción manual de la placenta
- ▶ Cesárea con trabajo de parto
- ▶ Monitoreo fetal interno
- ▶ Instrumentación uterina
- ▶ Atención de cesárea sin antibioprofilaxis



Medidas comprobadas de prevención

- ▶ Atención del parto con Técnica Aséptica
- ▶ Personal que atiende el parto con manos indemnes
- ▶ Indicación de tactos vaginales, no más de 4.
- ▶ Administración de antibioprofilaxis en caso Cesárea



La paramédico te presentará la caja estéril, en la que se encuentran los implementos necesarios que utilizarás en el parto

Medidas inefectivas

- ▶ Enema Evacuante
- ▶ Aseptización vaginal
- ▶ Rasurado púbico o perianal



- ▶ Referencias: Minsal, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, Norma para la Prevención de la Endometritis puerperal. 2008.

Actividad:

- 1.- Investigue y defina las 3 fases del parto.
- 2.- ¿Cuáles son los EPP que se deben usar en la tención de un parto?
- 3.- Observe el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=qHkk79ScFsU&has_verified=1

- 4.-Según los conocimientos adquiridos mencione al menos 3 errores relacionados con el uso de EPP y técnica aséptica.
- 5.- ¿Cómo se llama la incisión (corte) con tijera que realiza el obstetra en la vulva de la madre?

Fecha de entrega: 26/6/2020

Realizada la actividad deberá enviarla a los siguientes correos según el curso;

4 H Profeali.enfermeria@gmail.com

4 F profe.patricia.pacheco@gmail.com

4 G profesora.nataliareyes20@gmail.com